

Impact de l'épidémie Covid-19 sur l'activité des Centres de lutte antituberculeuse

Résultats de la cinquième enquête bimensuelle

- ▶ Semaine du 2 mars 2020
- ▶ Semaine du 16 mars 2020
- ▶ Samedi du 2 avril 2020
- ▶ Semaine du 4 mai 2020
- ▶ Semaine du 15 juin 2020

Dr P. Fraisse

Coordonnateur du Réseau national des Centres de lutte antituberculeuse
Responsable santé publique - Groupe pour la recherche et l'enseignement en infectiologie de la SPLF

Service de pneumologie
Nouvel hôpital civil

67091 Strasbourg cedex
Tél 0369550902

philippe.fraisse@chru-strasbourg.fr

Secrétariat Mme Paulette HEILIGENSTEIN

Tél 0369550379

paulette.heiligenstein@chru-strasbourg.fr



La poursuite d'activité des structures de prévention (CLAT, PASS, CEGIDD, autres)

- ▶ Objectifs
 - ▶ redéployer les activités sur des activités essentielles
 - ▶ contribuer à la limitation de la circulation du virus (public, personnels des structures).
- ▶ Modalités
 - ▶ suspendre toutes les activités collectives
 - ▶ maintenir un accueil téléphonique
 - ▶ maintenir des consultations en fonction de l'évaluation des besoins, en privilégiant les consultations à distance
 - ▶ afficher les mesures barrière
- ▶ Pour les CLAT
 - ▶ consultation médicale et délivrance des médicaments pour traiter les tuberculose et les ITL chez les moins de 15 ans, le suivi des patients sous traitement
 - ▶ les enquête autour d'un cas
 - ▶ le dépistage des sujets contacts au CLAT ou par prescription de radiographies
 - ▶ l'activité BCG peut être suspendue


Sachant que :
en période épidémique de forte transmission, la protection du personnel du CLAT et des bénéficiaires est susceptible d'être renforcée

Limiter l'impact de la pandémie Covid-19 sur la tuberculose

A major disruption in TB case detection could result in an additional 400 000 lives lost.



1.49 MILLION
DEATHS, 2018
WORLDWIDE



1.85 MILLION
ESTIMATED
DEATHS, 2020
WORLDWIDE

In the face of a pandemic, the prevention and treatment of killer diseases must continue.



World Health
Organization

20 May 2020

Synthèse - actions à valoriser

Les résultats globaux le 15 juin 2020


- ▶ Près de 80% des CLAT ont encore leur activité affectée par l'épidémie.
- ▶ Les missions les plus affectées sont les informations en collectivités, la coordination du parcours de soins, les dépistages (migrants, collectivités, entourage), le BCG.
- ▶ Les difficultés d'organisation concernant en priorité l'aménagement de la salle d'attente et le ralentissement de la filière, les stocks de SHA, l'absence de visibilité à long terme et les formations.
- ▶ On note une nette amélioration concernant les temps consommés pour réponse téléphonique aux questions sur la Covid-19, les disponibilités pour les radiographies thoraciques, la disponibilité des masques, l'ouverture des consultations, les réponses des ARS et dans une moindre mesure la coopération des partenaires naturels du CLAT.
- ▶ Une cohorte de patients co-infectés tuberculose et SARS-Cov-2 est en cours, nous avons recueilli 21 questionnaires, poursuite à encourager jusqu'à fin 2020 (lien web <https://fr.surveymonkey.com/r/VTFM6FW>).

Je remercie les collègues qui ont pris le temps de répondre à cette nouvelle enquête

- ▶ Elle rend compte de la situation au moment du déconfinement
- ▶ C'est la cinquième, un suivi est donc possible depuis le début de l'épidémie
- ▶ La prochaine est prévue à l'automne pour apprécier l'évolution après élargissement des contacts sociaux et reprise complète des activités des CLAT

69 répondants


CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
▼ Structure hospitalière	60,87%	42
▼ Départemental	30,43%	21
▼ Centre de soins	8,70%	6
TOTAL		69




Enquête semaine du 15 mai 2020

L'épidémie de Covid-19 affecte l'activité de votre CLAT (% des répondants)

Dont 1 CLAT hospitalier ayant cessé toute activité le 15 juin 2020



L'épidémie de Covid-19 affecte l'activité de votre CLAT (% des répondants) hospitaliers (n=44)/non hospitaliers (n=26)



Dont 1 CLAT hospitalier ayant cessé toute activité le 15 juin 2020

■ Non hospitaliers
■ Hospitaliers


Au passage...

- ▶ Réponse d'un CLAT le 18 août 2020 à une demande de renseignements sur un sujet contact
- ▶ « Nous n'avons plus de médecin CLAT dans notre établissement et ce depuis 1 an. L'ARS en est informée. »

L'impact du Covid sur les missions des CLAT

1 - information / communication

Comparaison des cinq enquêtes*




* Les items avec barre absente ne figuraient pas dans la première ou la deuxième enquête

L'impact de la Covid sur les missions des CLAT

2 - les dépistages


Comparaison des cinq enquêtes*



* Les items avec barre absente ne figuraient pas dans la première enquête

L'impact de la Covid sur les missions des CLAT

3 - la filière d'aval et les masques




* Les items avec première-troisième barre absente ne figuraient pas dans les premières enquêtes

L'impact du Covid sur les missions des CLAT


4 - l'organisation du CLAT

Comparaison des cinq enquêtes*



* Les items avec barre absente ne figuraient pas dans la première ou la deuxième enquête

Si vous en aviez les moyens, seriez-vous favorable à un engagement de votre CLAT dans les domaines suivants en lien avec l'épidémie de COVID-19 ?



Enquête semaine du 15 juin 2020

La reprise des activités des CLAT

Prendre en compte les mesures générales d'hygiène

Assurer les activités essentielles précédemment définies

Tendre vers une reprise normale d'activité avec les priorités

Rattrapage des activités essentielles (recherche des cas index perdu de vue pour les inscrire dans un parcours de soins ; recherche de cas index n'ayant pas fait l'objet d'un signalement ; identification des sujets contacts qui n'aurait pas été dépistés)

Réalisation des dépistage de l'ensemble des sujets contacts au-delà des populations prioritaires

Relancer les dépistages ciblés en particulier les risques plus importants de développer une tuberculose ou d'être infectée (HUDA, CADA, CASO, structures d'accueil des mineurs non accompagnés...)

Relancer le BCG

Cibler dans un premier temps sur les enfants de moins de cinq ans ayant un cas de tuberculose récent dans leur entourage (bien entendu après dépistage négatif d'une infection latente), puis pour l'île de France, Mayotte, et tous les enfants à risque

▶ Mesures et recommandations sanitaires générales

- ▶ mesures d'hygiène standard
- ▶ port du masque
- ▶ hygiène et aération des locaux

▶ Organisation des locaux et des activités

▶ Reprise des activités selon les structures

- ▶ Service départementaux de protection maternelle et infantile
- ▶ Centre de planification et d'éducation familiale
- ▶ CEGIDD
- ▶ Centres de lutte antituberculeuse
- ▶ Centres de vaccination
- ▶ Centres de soins d'addictologie