



**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction générale de la santé

BCG – RETOUR EN VILLE

JOURNÉES DES CLAT 2021

Julie Bouscaillou et Camille Dorin

Une volonté de la Feuille de Route Tuberculose 2019 - 2023

Action 3 Feuille de Route Tuberculose 2019 – 2023 « Adapter les stratégies vaccinales par le BCG »

1. Accompagner la levée de l'obligation vaccinale BCG des professionnels
2. Améliorer les conditions d'accès et d'administration du BCG pour les enfants les plus vulnérables pour lesquels il est recommandé
 - ⇒ Vigilance renforcée sur les mesures de gestion de pénurie ou de tensions d'approvisionnement
 - ⇒ Créer les conditions favorables du retour sur le marché français d'un vaccin sous AMM

Rappel des évolutions récentes

- Suspension de l'obligation vaccinale chez l'enfant en 2007, mais reste recommandé chez les jeunes enfants à risque
- Fortes tensions d'approvisionnement en vaccin BCG de Sanofi dès fin 2014 jusqu'au retrait du marché en 2016.

Ces tensions ont conduit à :

- ✓ Acquérir des vaccins à l'étranger
- ✓ Prioriser les populations éligibles à la vaccination
- ✓ Réserver la vaccination aux structures publiques de vaccination (CLAT, PMI, CV)
- Depuis 2019 : sécurisation de l'approvisionnement en BCG AJVaccines, mais toujours délivré exclusivement en structures collectives

Niveaux de priorisation

- **1er niveau**

a) Guyane et Mayotte : vaccination de tous les nouveau-nés avant la sortie de la maternité.

b) Autres départements dont ceux de l'Île-de-France : vaccination des enfants âgés de moins de 5 ans ayant un facteur de risque de tuberculose identifié à l'exclusion de la seule résidence en Île-de-France

- **2e Niveau :**

Vaccination des enfants âgés de moins de 5 ans dont le seul facteur de risque est de résider en Ile-de-France.

- **3e Niveau :**

France entière : vaccination de tous les enfants âgés de 5 à 15 ans révolus présentant un facteur de risque de tuberculose identifié et après test tuberculinique.

Impact épidémiologique

- ⇒ Pas d'aggravation de la situation épidémiologique suite à la suspension de l'obligation vaccinale
- ⇒ Les enfants âgés de moins de 15 ans représentent **5%** des cas en 2019
- ⇒ La proportion de cas de tuberculose chez l'enfant de moins de 13 ans (nés après la suspension de l'obligation vaccinale de 2007) est en diminution par rapport à 2005 (**4% en 2019 vs 5% en 2005**)
- ⇒ En 2019 : **10 formes méningées ou miliaires** observées chez les enfants de moins de 15 ans, très inférieur à 2017 (**18**)

Retour en ville

- ⇒ Volonté d'un retour en ville pour **2022**
- ⇒ Enjeu d'information et de formation des PS au regard de la présentation du vaccin, de l'injection intradermique, du suivi des effets secondaires
- ⇒ Constitution d'un groupe de travail pour accompagner ce retour et ses modalités (médecins de PMI, CLAT, infectiologues, généralistes, pédiatres, SpF, ANSM, Conseil de l'ordre)

Questions / Discussion

