

CONSEILS AUX PARENTS SUITE A LA VACCINATION BCG

Vaccin BCG = vaccin contre la tuberculose

Pôle de Santé Publique et Communautaire
Service : CLAT 74 Sud
(Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse)
Dr Geneviève GRAVIL-BAILLON
N° RPPS : 10003131751
Secrétariat : 04 50 63 64 89
clat74sud@ch-annecygenevois.fr

Votre enfant vient de recevoir le vaccin BCG, par **voie intradermique**, veuillez trouver ci-dessous les différentes **suites normales** liées à ce vaccin.

Informations générales :

Ce vaccin ne provoque **pas de fièvre** dans les jours qui suivent la vaccination et ne nécessite aucun soin. En cas de fièvre, consultez le médecin traitant.

Une seule dose suffit au cours de la vie.

L'efficacité du vaccin démarrera dans 2 à 3 semaines et sera maximale dans 2-3 mois, durée moyenne de la réaction suite à ce vaccin.

Situations possibles au point d'injection :

- Pas de réaction à l'endroit du point d'injection ; rien à faire dans ce cas.
- **Dans deux ou trois semaines**, il peut présenter une petite rougeur (petit bouton rouge comme un bouton de piqûre de moustique). 2 évolutions :
 - ✓ Le bouton reste au stade de **bouton** : rien à faire dans ce cas
 - ✓ Le bouton peut prendre un aspect gonflé, boursoufflé, qui ressemble à un abcès, **mais ce n'est pas un abcès**, il ne faut surtout **pas le toucher et attendre que le liquide sorte tout seul**. Ce bouton peut suinter et produire dans certains cas, **un petit écoulement jaunâtre**, non purulent, pendant 3 à 8 semaines. Dans ce cas-là, il est recommandé **de nettoyer avec de l'eau et du savon**, au moins une fois par jour, jusqu'à la cicatrisation.

Toutes ces réactions sont normales et ne doivent pas vous inquiéter. Elles guérissent spontanément en laissant une petite tache rosée qui laissera place à une cicatrice vaccinale.

CONSEILS EN CAS DE SUINTEMENT PROLONGE

- Ne pas chercher à faire cicatriser par des poudres ou pommades désinfectantes et cicatrisantes
- Appliquer une petite compresse sèche stérile maintenue par une bande de gaze pour éviter le frottement des vêtements. Eviter le pansement avec sparadrap qui peut créer des réactions allergiques locales
- A la belle saison exposer son bras au soleil
- En cas de baignade prolongée, mettre un pansement qui résiste à l'eau
- Eviter de mettre des vêtements trop serrés pour limiter le frottement

Pour toute précision concernant les suites de ce vaccin, vous pouvez me joindre au 04 50 63 64 89.

Dr Geneviève GRAVIL-BAILLON
Médecin Coordinateur du CLAT 74 Sud