

## مشوره به والدین پس از تطبیق واکسین BCG

### واکسین BCG = واکسین توبرکلوز (سیل)

طفل شما به تازگی واکسین علیه توبرکلوز را از طریق تزریق عضلانی دریافت کرد. در ذیل تأثیرات مختلف نرمال این واکسین برای تان شرح می دهیم.

#### معلومات عمومی:

این واکسین، در روزهای پس از تطبیق آن، باعث تب نمی شود و نیاز به هیچگونه مراقبت صحی ندارد. در صورتی که طفل تب داشته باشد، به داکتر معالج مراجعه کنید.

یک قطره از واکسین برای تمام عمر کافی است.

تأثیر واکسین از 2 الی 3 هفته بعد از تطبیق شروع می شود و در 2 الی 3 ماه پس از تطبیق به اوج آن می رسد، که این دوره اوسط واکنش بدن به واکسین می باشد.

#### واکنش های احتمالی بدن طفل در قسمت تزریق شده:

- نقطه ای از بدن طفل که واکسین تزریق شده، هیچ حساسیتی نشان نداده است؛ در این صورت نیاز نیست کاری انجام دهید
- در دو الی سه هفته بعد از تطبیق واکسین، ممکن است در نقطه تزریق یک حالت سرخی کوچک نمایان شود (یک بخار سرخ کوچک، شبیه جای گزیدن پشه)، دو حالت ممکن است پیش بیاید:
  - ✓ بخار در حالت بخار باقی می ماند: نیاز نیست کاری انجام دهید
  - ✓ بخار حالت ورم (پندیدگی) یا تاول پیدا می کند که شبیه یک دانه است، ولی در اصل دانه نیست. به هیچ صورت نیاید به آن دست زد، باید منتظر ماند که مایع خودش خارج شود. این بخار در بعضی وارد، می تواند مایع تراوش کند و ترشحات به رنگ مایل به زرد بدون چرک داشته باشد و این برای مدت 3 تا 8 هفته دوام کند. در این صورت، توصیه می شود که آن را با آب و صابون پاک کنید، حداقل یک بار در روز تا زمانی که التیام پیدا کند.

همه این واکنش ها عادی هستند و نباید باعث تشویش شما شوند. آنها خود بخود خوب می شوند و یک لکه به رنگ صورتی به جا می گذارد که به مرور زمان فقط نقطه جای واکسین قابل تشخیص خواهد بود.

#### توصیه ها در صورتی که تراوشات ادامه پیدا کند

- سعی نکنید که با استفاده از پودر یا پوماد ضد عفونی آن را التیام بخشید
- کمپرس خشک و کوچکی که توسط نوار گاز نگهداشته شود، روی نقطه بگذارید تا از مالیدن لباس به آن جلوگیری کند. از استفاده پانسمان با گچ چسب خودداری کنید چون ممکن است باعث واکنش الرژیک موضعی (حساسیت) شود.
- وقتی هوا خوب باشد، بازوی طفل را در آفتاب قرار دهید
- در صورت ترشح مایعات، یک پانسمان مقاوم در برابر آب در آن نقطه قرار دهید
- از پوشاندن لباس بسیار تنگ خودداری کنید تا از مالیده شدن لباس به نقطه تزریق جلوگیری شود

برای هرگونه معلومات در مورد تأثیرات واکسین می توانید با من به تماس شوید.

داکتر ژنیویو گراویل-بیان Dr Geneviève GRAVIL-BAILLON

داکتر هماهنگ کننده

CLAT 74 SUD

Tel : 04 50 63 64 89

Fax : 04 50 63 64 90

Mail : [clat74sud@ch-annecygenevois.fr](mailto:clat74sud@ch-annecygenevois.fr)

Centre Hospitalier Annecy Genevois

1 avenue de l'hôpital

74370 Epagny Metz-Tessy

[www.ch-annecygenevois.fr](http://www.ch-annecygenevois.fr)