

EBEVEYNLERE BCG AŞISI İLE İLGİLİ TAVSİYELER BCG AŞISI = VEREM AŞISI

Çocuğunuz **deri altına zerk yoluyla** BCG aşısı olmuş bulunmaktadır. Bu aşının **normal seyri** aşağıda belirtilmiştir.

Genel bilgiler:

Bu aşı izleyen günlerde **ateşe neden olmaz** ve hiçbir tedavi gerektirmez. Ateş görülürse aile hekiminize başvurunuz.

Bir doz aşı ömür boyu etkilidir.

Aşının etkisi 2-3 hafta içinde görülmeye başlar ve 2-3 ay içinde zirve noktasına erişir. Bu, aşıya ortalama tepki süresidir.

Aşı noktasında olası durumlar

- Aşı noktasında her hangi bir tepki yoksa bir şey yapmanız gerekmez.
- **iki veya üç hafta sonra** küçük bir sivilce gibi bir iz olursa iki ihtimal vardır:
 - ✓ Sivilce bu boyutta kalırsa bir şey yapmanız gerekmez.
 - ✓ Sivilce apseye benzeyen bir şişkinlik gösterebilir. Bu bir apse değildir. **Elinizi sürmeyiniz ve sıvının kendiliğinden çıkmasını bekleyiniz.** Bazen **sarı bir akıntı görülebilir** ve 3 ila 8 hafta sürebilir. Bu durumda yara kapanana kadar günde en az bir **kere sabunlu su ile temizleyiniz.**

Bütün bu tepkimeler normaldir. Merak etmeniz gerekmez. Kendiliğinden geçer ve yerini küçük pembe bir ize bırakır.

AKINTININ UZUN SÜRMEŞİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR

- Toz ve merhemler kullanarak geçirmeye çalışmayınız.
- Steril kuru bir kompres kullanınız ve gazlı bez ile sarınız. Giysilerinize sürtünmeyi önleyiniz. Alerjik tepki yaratabileceği için yara bandı kullanmayınız.
- Havanın müsait olması durumunda kolunuzu güneşe tutunuz.
- Uzun süre suya görmenez durumunda suya dayanıklı bir pansuman kullanınız.
- Sürtünmeyi önlemek için çok sıkı giysiler kullanmayınız.

Bu aşı ile ilgili ayrıntılı bilgi için beni aşağıdaki adresten arayabilirsiniz:

Dr. Geneviève GRAVIL-BAILLON
Koordinatör Hekim