

As 7 regras d'or

1 Deixe o braço que recebeu a vacina descoberto o mais tempo possível, para facilitar a cicatrização

2 Ponha roupa que não aperte no local da injeção

3 Caso um pouco de líquido escorrer (secreção) no local da injeção, aplique simplesmente um penso em cima

4 NÃO APLIQUE NENHUMA POMADA, NEM PÓ DE TALCO, NEM QUALQUER OUTRO PRODUTO no local onde foi feita a injeção, nem no nódulo

5 Não dê nenhum antibiótico

6 Tomar banho ou duche é autorizado desde o primeiro dia da vacina. No entanto, evite tomar banho na piscina ou no mar caso estiver a escorrer líquido (secreção) no local da injeção


7 Consulte o seu médico se :

- A zona dura (nódulo) que apareceu à volta do local da injeção medir mais de 3 cm
- Verificar um desconforto nos movimentos
- O nódulo, que apareceu debaixo do braço for visível a olho nu e amolecido (purulenta)

INFORMAÇÃO SOBRE A VACINAÇÃO DA BCG

CENTRO DE LUTA ANTI- TUBERCULOSE DA MAYENNE (CLAT 53)

Centro Hospitalar
33 Rue du Haut Rocher
CS 91 525
53000 LAVAL
Tel : 02 43 66 50 55
Mail : clat53@chlaval.fr



A Tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa devido a bactérias chamadas bacilos de Koch. É transmitida entre pessoas, quando se tosse ou espirra, durante contactos próximos e frequentes com pessoas infetadas.



Os sintomas da doença são principalmente a tosse, a febre, o cansaço, a perda de apetite com emagrecimento, as transpirações nocturnas (suores).



A Vacina BCG



A BCG é uma vacina que tem como objetivo de proteger contra a tuberculose. Desde 2007, a vacina já não é obrigatória. Esta é recomendada para crianças com risco elevado de tuberculose à nascença e até aos 15 anos de idade.

- É uma vacina viva atenuada.
- Esta vacina tem por objetivo principal o de proteger crianças pequenas de formas graves da tuberculose que são 75% dos casos (meningite tuberculosa, tuberculose miliar).
- Esta não permite impedir a transmissão da doença nem de pôr termo à epidemia mundial.
- Para crianças com mais de 3 meses, é necessário e obrigatório realizar um teste tuberculínico (IDR). Depois da vacina, não é necessário efetuar controlo de IDR nem efetuar a vacina da BCG várias vezes.
- A vacina da BCG pode ser administrada no mesmo dia que qualquer outra vacina.

As Indicações Vacinais

É altamente recomendado que faça vacinar os seus filhos desde a nascença e até aos 15 anos de idade se :

- Residir na região Ile de France (quaisquer que sejam o departamento e as condições de vida), na Guiana ou em Maiote
- Se o seu filho(a) tiver nascido num país com forte endemia de tuberculose
- O seu filho(a) tiver pelo menos um dos pais originário de um país com forte endemia de tuberculose
- O seu filho(a) tiver que ir viver pelo menos um mês num país com forte endemia de tuberculose
- O seu filho(a) tiver antecedentes familiares de tuberculose
- O seu filho(a) está numa situação que o médico julgue arriscada e com risco de exposição ao bacilo da tuberculose



Os Efeitos Colaterais da BCG

Habitualmente, a BCG não produz reações de ordem geral, nem febre, nem cansaço. Todavia depois da injeção, aparece uma pápula clara e a pele fica com um aspeto de casca de laranja.

. Essa reação desaparece em alguns minutos.



Nas 48 horas após a injeção pode aparecer uma erupção cutânea (pele avermelhada e induração)



Durante os 3 meses após a vacina, é habitual ter um endurecimento no local da injeção, acompanhado por uma lesão local com ou sem secreção. Esta lesão pode permanecer vários meses até desaparecer e cicatrizar completamente. O aparecimento de um nódulo, debaixo do braço que levou a injeção é uma reação previsível.



A persistência definitiva de uma cicatriz é a regra