

TUBERCULOSE PULMONAIRE

(Réponses)

1/ Pourquoi moi ?

- 1° Vous avez un jour été au contact d'une personne atteinte de tuberculose pulmonaire. peut-être sans le savoir.
- 2° Cette personne ne savait peut-être pas elle-même qu'elle était atteinte de cette pathologie, et n'a donc pas pu vous en avertir
- 3° Le bacille s'est logé en vous où il resté endormi jusqu'à aujourd'hui.



2/ Un seul mode de contamination : L'air

En parlant, en chantant, en respirant vous expirez de l'air contaminé et risquez de contaminer les personnes autour de vous.



3/ Mon traitement

Quelle famille de médicaments ?

-Antibiotiques

Quand le prendre ?

-Le matin à jeun et attendre au moins une heure avant la prise du petit-déjeuner. Ceci pour une meilleure efficacité du traitement.

Pendant combien de temps ?

- 4 antibiotiques: 2 mois
- 2 antibiotiques: 4 mois
- => Durée totale : 6 mois



Ses effets secondaires ?

- Toxicité hépatique (Pirilène, iRimifon, Rifadine)
- Interactions médicamenteuses: Votre médecin doit donc connaître tous les autres médicaments que vous prenez (Rifadine)
- Trouble de la vision des couleurs (Dexambutol)
- Troubles digestifs (Rimifon)
- Urines, larmes teintées en orange (Rifampicine)
- Rush cutané

6/ Et pour mon entourage ?

-Avec votre accord, lors de la visite d'entourage, l'infirmière du CLAT et vous recenserez toutes les personnes ayant été à votre contact dans les mois précédents le diagnostic (au moins 3 mois en arrière).

-Ces personnes feront partie de votre entourage familial, professionnel, amical, scolaire...

-Elle seront invitées par la même infirmière à se présenter au CLAT afin de bénéficier d'un suivi préventif. Ce suivi comprendra des test tuberculiques ainsi que des radiographies thoraciques.

Il s'échelonne sur une durée de 2 ans.

=> Les radiographies thoraciques sont le seul moyen de s'assurer que vos proches ne deviennent pas contagieux à leur tour.

-Les personnes immunodéprimées et les enfants de moins de 2 ans, sont plus fragiles face à la maladie.



4/ Mon suivi :

1° Imagerie médicale

Radiographie thoracique : 1 fois par mois les 2 premiers mois du traitement.

Au 4ème mois et à la fin du traitement.

Puis à 1 an, à 18 mois et pour finir à 2 ans du diagnostic.

Le médecin peut être amené à vous prescrire un scanner, qui est un examen plus précis que la radiographie.

2° Clinique

Consultations médicale à 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois du début du traitement. Puis lors des radiographies de contrôle suivantes.

3° Bactériologique

Si l'évolution clinique ou les images radiologiques n'évoluent pas, des prélèvements bactériologiques peuvent encore vous être prescrits.

4° Biologique

Bilan sanguin avant traitement, à J 15, puis tous les mois jusqu'à la fin du traitement

5° Ophtalmologique

Si du Dexambutol vous est prescrit vous devrez vous rendre à 2 consultations d'ophtalmologie afin de réaliser un test de la vision des couleurs.



5/ A quelle couverture sociale ai-je droit ?

1°La tuberculose est une maladie reconnue comme une affection de longue durée: ALD.

2°A ce titre, une demande doit être faite par le médecin hospitalier et /ou par votre médecin traitant.

3°Cette ALD permet une prise en charge à 100% de tous les frais de santé ayant trait à la tuberculose, pendant 2 ans à partir du diagnostic. Sans que vous n'avanciez de frais.(médicaments, bilans sanguins, imagerie médicale, consultations...)



Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse

3, rue Sarrelouis

67000 Strasbourg

Tél : 03 68 33 87 50