



# CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

## SERVICE DE MEDECINE

Unité de pneumologie pédiatrique  
Secrétariat : 03.83.15.48.70

Docteur

Nom :  
Prénom :  
DDN :  
Poids :

Nancy le

### **Traitement de fond à prendre tous les jours qsp 3 mois**

1. FLIXOTIDE 50µg spray 2 bouffées matin et soir

### **Traitement à prendre en cas de gêne respiratoire et/ou sifflement (cf protocole)**

2. VENTOLINE spray 100µg (3 sprays)
3. SOLUPRED comprimé oro dispersible 20mg (2 boîtes)

### **Autre traitements**

- 1 chambre d'inhalation avec masque adapté à l'âge de l'enfant
- 1 ampoule de vitamine D UVEDOSE 100 000ui

***Ce plan d'action a été développé par l'équipe de pédiatrie du CHU de Nancy***

## Protocole en cas de crise 2-6 ans

Mon enfant présente un de ses signes :

Toux sèche  Gêne respiratoire  Essoufflement  Respiration sifflante  Pâleur



- Faire asseoir l'enfant le rassurer le garder sous surveillance d'un adulte au calme
- Faire inhaler 4 bouffées de VENTOLINE
- Dans la chambre d'inhalation la procédure est la suivante :  
(cf. QR code ci- contre)
- Dans tous les cas, secouer le spray
- Placer le masque sur le visage
- Appuyer UNE fois sur le spray et laisser respirer l'enfant calmement 10 fois
- Recommencer pour un total de 4 bouffées



Crise légère

Si amélioration et disparition des symptômes ou persistance seulement d'encombrement ORL sans toux associée  
→ Arrêter la VENTOLINE

Crise modérée

Si dans les 20 min suivantes il n'y a pas d'amélioration  
→ Refaire 4 bouffées de VENTOLINE à répéter toutes les 20min la première heure

Poursuivre la VENTOLINE 4 bouffées \*4/jours pendant en moyenne 3 à 5 jours  
En l'absence d'amélioration nécessité de consulter un médecin

Si dégradation ou pas d'amélioration



**Si présence de signe de gravité**

= Crise sévère

A du mal à parler et à tousser / Sueurs/ agitation



Donner du SOLUPRED 20mg (1cp) Et faire inhaler 6 bouffées de toutes les 20minutes la première heure

- Si amélioration poursuivre la VENTOLINE 4 bouffées \*4/jours pendant que les signes persistent en moyenne 5 à 7 jours et SOLUPRED 20mg 1 fois par jour pendant 3 jours
- Si pas d'amélioration ou apparition de trouble de la conscience ou de pauses respiratoires  
**APPELER le SAMU (15 ou 112) et suivre les consignes données**

**Ce plan d'action a été développé par l'équipe de pédiatrie du CHU de Nancy**

CHU de NANCY – Hôpital de Brabois enfants – Rue du Morvan – 54511 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY CEDEX

Tél : 33 (0)3 83 15 30 30